

<i>Naam van de praktijk</i>	Voorbeeld-protocol Up to date houden spoedtas	
<i>Logo van de praktijk</i>	Protocolnummer:	Versie:
	Auteur:	Vaststellingsdatum:
	Beheerder (naam):	Herzieningsdatum:
	Bestemd voor (functie(s)):	
Disclaimer	Er zijn geen rechten te ontleen aan het gebruik van de protocollen ten aanzien van de accreditering. Het is een hulpmiddel.	

Wat is het doel van de werkinstructie?

Door dit protocol te gebruiken zijn de geneesmiddelen in de dokterstas/spoed tas altijd compleet en up-to-date. Dit is een randvoorwaarde voor adequate hulp in spoedeisende situaties. **LET OP:** Daarnaast dient u alle benodigde medische apparatuur te controleren op ijking en defecten. Let ook op expiratedatum van bijv. naalden en verbandstoffen!

Randvoorwaarden

- De huisartsen hebben een eigen dokterstas altijd in hun nabijheid.
- Er is een lijst geneesmiddelen in de dokterstas/spoedtas aanwezig.
- Deze lijst is vastgesteld door de huisarts en sluit zoveel mogelijk aan bij de NHG Farmacotherapeutische richtlijn 'Geneesmiddelen in spoedeisende situaties'. Hierin is aangegeven welk middel in de tas aanwezig moet zijn met welke verloopdatum.
- Tevens zijn er meerdere geneesmiddelen voor spoedeisende situaties in de praktijk zelf aanwezig.

Werkinstructie

De tassen worden minstens eens per 3 maanden gecontroleerd.

Deze planning is vastgelegd in de agenda van het HIS. De assistentes hebben een coördinerende e/o uitvoerende rol.

NB. Denk ook aan de tassen van eventuele waarnemers!

Middelen waarvan de houdbaarheid niet gegarandeerd is tot aan de volgende controle, worden verwijderd. **Bij verlopen geneesmiddelen** wordt een recept gemaakt op naam van de praktijk.

Na gebruik van een geneesmiddel wordt deze door de huisarts aangevuld door het maken een (herhaal)recept op naam van de patiënt.
De apotheek bezorgt de geneesmiddelen op de praktijk.

Op de volgende bladzijde vindt u een activiteitentabel

U = uitvoeren

Activiteiten (benodigdheden, voorbereiding, checklist, werkwijze, complicaties, let op)	Verantwoordelijkheden functie(-groep)
Voorbereiding Tassen klaarleggen Inventarislijst geneesmiddelen die in de dokterstas\spoedtas aanwezig moeten zijn inclusief expiratiedata klaarleggen (zie Bijlage 1)	U: assistente en huisarts
Controle Geneesmiddelen controleren aan de hand van inventarislijst Recepten voor ontbrekende geneesmiddelen klaarmaken Geneesmiddelen waar nodig aanvullen\vervangen Expiratiedata bijwerken op de lijst Ongebruikte geneesmiddelen die over de expiratedatum heen zijn retour apotheek	U: assistente en huisarts
Autoriseren Recepten voor ontbrekende geneesmiddelen autoriseren	U: huisarts
Incidenteel gebruik Melden welke geneesmiddel is gebruikt Zo nodig recept klaarmaken en autoriseren	U: huisarts
Aanvulling bij incidenteel gebruik Gebruikt geneesmiddel aanvullen Expiratedatum op lijst bijwerken	U: assistente
Planning In agenda's datum\data vastleggen volgende controle	U: assistente

Bijlage 1: Geneesmiddelen bij spoed

De vetgedrukte geneesmiddelen zijn verplicht volgens de NHG praktijkaccreditatie (NPA), de anderen zijn aanbevolen door de NHG. Ter beoordeling aan uzelf. Bij minimum aantal kunt u ook uw eigen voorkeur aangeven. Aanbevolen wordt om van elk geneesmiddel ten minste één in reserve te hebben. Van de volgende geneesmiddelen kunnen voor de eerste behandeling al meerdere tabletten of ampullen nodig zijn: Acetylsalicylzuur 80 mg tablet: 3 tabletten, Furosemide (40 mg/4 ml): 1 tot 3 ampullen, morfine (10 mg/ml): één tot meerdere ampullen (afhankelijk van de bestaande dagdosering morfine), Glucoseoplossing 4-5 gram/10 ml: 2 tot 4 ampullen.

Controledatum:				
Geneesmiddel/afleverings-vorm*	Aantal	expiratie datum	expiratie datum	expiratie datum
Acetylsalicylzuur tablet 80,100 mg of Carbasalaatcalcium sachet 300 mg				
Atropine ampul 0,5 mg/1 ml				
Biperideen ampul 5 mg/1 ml				
Clemastine ampul 2 mg/2ml				
Clorazepinezuurpoeder 50 mg + solvens 2,5 ml				
Dexamethason ampul: 5 mg/1ml				
Dexamethason tablet: 0,5 en 1,5 mg				
Diazepam ampul 10 mg/2 ml Diazepam rectiole 5 en 10 mg				
Diclofenac ampul 75mg/ 3 ml				
Epinefrine ampul 1 mg/1 ml				
Fentanyl ampul 0,1 mg /2ml				
Furosemide ampul 40 mg/4ml				
Glucagon poeder 1 mg + solvens 1 ml				
Glucoseoplossing ampul 10 ml 40-50% (4-5 gram/10ml)				
Haloperidol ampul 5 mg/1 ml				
Ipratropiumbromide dosisaërosol 20 mcg/dosis				
Lorazepam tablet 1 mg (of diazepam, oxazepam tablet 10 mg)				
Midazolam ampul 15 mg/3 ml Midazolam ampul 5 mg/5 ml				
Morfine ampul 10 mg/1 ml				
Naloxon ampul 0,4 mg/1 ml				
Nitroglycerine spray 0,4 mg/dosis of Isosorbidedinitraat tablet 5 mg				
Salbutamol dosisaërosol 100 mcg/dosis (+inhalatiekamer), Salbutamol ampul 0,5 mg /1 ml				
Fysiologisch zout ampul 10 ml				
Paraaf medewerker				